

Профилактика инфекций, передающихся половым путем

ЧТО ТАКОЕ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ?

ИППП – это заболевания, передающиеся преимущественно во время полового акта от одного инфицированного партнера другому

В настоящее время известно более 30 ИППП. Наиболее часто встречающиеся из них : сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, кандидоз, папилломовирусная инфекция, генитальный герпес, гепатит В,

СПИД и др.

ИППП оказывают глубокое воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье во всем мире.

Ежедневно более одного миллиона человек приобретают ИППП. По оценкам ВОЗ, ежегодно 357 миллионов человек приобретают одну из четырех ИППП — хламидиоз (131 миллион), гонорее (78 миллионов), сифилис (5,6 миллиона) или трихомониаз (143 миллиона). Более 500 миллионов человек живут с инфекцией генитального ВПГ (герпеса). На любой момент времени более 290 миллионов женщин инфицированы ВПЧ, одной из наиболее распространенных ИПП

ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО:

- при сексуальном контакте (не только при половом, но и при оральном, анальном)
- при контакте с зараженной кровью (например, ВИЧ/СПИД, гепатит В и С)
- редко – бытовым путем.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ?

если они не лечатся или лечатся неправильно:

- переходят в хроническую, скрытую форму;
- вызывают необратимую утрату здоровья, как, например, бесплодие;
- во время беременности могут передаваться еще не родившемуся ребенку или младенец может заразиться во время родов.

КТО МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ИППП?

- Заразиться ИППП может каждый активный в половом отношении человек.
- ППП заражаются мужчины и женщины независимо от возраста, места жительства, этнической принадлежности и доходов.

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКОВ НАЗЫВАЮТ ГРУППОЙ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ИППП?

- часто рано начинают половую жизнь,
- меняют половых партнеров, вступают в сексуальные контакты с малознакомыми лицами, подвергая себя значительному риску инфицирования
- рано начинают употреблять алкоголь, наркотики и другие одурманивающие и веселящие вещества, что способствует легкой смене половых партнеров
- не знают многих вопросов профилактики ИППП, а иногда – не хотят знать
- не имеют достаточно денег, чтобы купить средства предохранения от нежелательных ИППП
- существует ряд физиологических особенностей юного поколения, способствующих большей вероятности заражения.

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ...КТО БОЛЬШЕ РИСКУЕТ?

- Анатомия женщины изначально повышает риск получения ИППП по сравнению с мужчиной.
 - У женщин, менее вероятно, будут выраженные симптомы инфекций
 - Женщины имеют больше шансов перепутать симптомы ИППП с чем-то еще.
 - Женщины часто не могут видеть проявления заболевания так же легко как мужчины.
 - ИППП могут привести к серьезным осложнениям и затронуть будущие репродуктивные планы женщины.
 - Беременная женщина может передать ИППП младенцу.
 - Вирус папилломы человека (ВПЧ) является довольно распространенной передающейся половым путем инфекцией у женщин, и может быть главной причиной рака шейки матки.
- хорошие новости
- Женщины, как правило, обращаются к гинекологу чаще, чем мужчины к урологу.
 - Существующая вакцина для профилактики ВПЧ и доступное лечение других ИППП могут предотвратить серьезные медицинские последствия
 - На сегодняшний день существует много информационных ресурсов, доступных женщинам, чтобы узнать больше о мерах, которые они могут предпринять, чтобы защитить себя от ИППП

КАКИЕ СИМПТОМЫ СОПРОВОЖДАЮТ ИППП

Как правило, к наиболее часто встречающимся симптомам
У МУЖЧИН ОТНОСЯТСЯ:

- неприятные ощущения (дискомфорт) в мочеиспускательном канале;
- рези, жжение, боль при мочеиспускании;
- периодически возникающее учащенное мочеиспускание;

- появление выделений из мочеиспускательного канала (они могут быть как - прозрачными, так и гнойными);
- язвочки, пузырьки или бородавки на половых органах, коже промежности или на других участках.
- увеличение лимфоузлов.

У ЖЕНЩИН:

- могут появиться неприятные ощущения (жжение, рези, болезненность) при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание;
- изменяется характер выделений из влагалища и их количество (они могут приобретать неприятный запах);
- язвочки или другие высыпания в области наружных половых органов, промежности или на других участках кожных покровов;
- болезненность во время полового акта;
- боль в нижней части живота;
- увеличение лимфоузлов.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ?

- после полового контакта может не появиться никаких симптомов
- большинство женщин и мужчин, заразившихся ИППП вообще не чувствуют никаких изменений из-за того, что их нет или они могут быть в таком месте, где их нельзя увидеть или почувствовать

СИСТЕМА оказания медицинской помощи больным с ИПП



ИЗЛЕЧИМЫ ЛИ ИППП?

- Бактериальные инфекции – да
- Вирусные – смягчение течения, профилактика рецидивов

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

ИППП являются причинами серьезных осложнений:

- восходящие воспалительные процессы, вызывающие внематочную беременность,
- неблагоприятные исходы беременности,
- бесплодие,
- онкологические заболевания половых органов у женщин,
- снижение потенции, вплоть до импотенции у мужчин.
- Наличие ИППП у человека многократно повышает риск заражения ВИЧ-инфекций.

Самым тяжелым заболеванием считается сифилис – поражение нервной системы, внутренних органов, негативное влияние на генофонд и др.


В течение 20 лет (1990-2010 гг.) в Республике Беларусь сифилисом переболели 147 328 человек.

Пик заболеваемости – 1996 г. (21616 новых случаев заболеваний сифилисом).


Несмотря на ежегодное снижение (до 2006 г.) заболеваемости число новых случаев сифилиса остается довольно высоким:

в 2006 г.	315	2012	99	2018	65
в 2007 г.	158	2013	148	2019	70
в 2008 г.	177	2014	114	2020	249
в 2009 г.	152	2015	105	2021	378
в 2010 г.	132	2016	95	2022	350
в 2011 г.	163	2017	88		


ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ С 1971 ПО 2016 ГОДЫ




**ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ НАСЕЛЕНИЯ
Г.МИНСКА ЗА ПЕРИОД 1991-2016 ГОДЫ**



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА В Г. МИНСКЕ В 1991-2016ГГ.




ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СРЕДИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ В Г. МИНСКЕ В 2006-2016ГГ.




ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ СРЕДИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ


мужчины



Женщины



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2017-2022 ГОДЫ



ВЫВОДЫ:

- заболеваемость сифилисом растет,- относительное эпидемиологическое благополучие сохраняется
- Рост заболеваемости сифилисом сопровождается изменениями в структуре клинических форм в сторону доминирования числа скрытых форм
- несвоевременное выявление и лечение больных сифилисом может приводить к развитию тяжелых форм заболевания, приводящих в дальнейшем к инвалидизации пациента
- Не леченные ИППП могут иметь критические последствия для репродуктивного, материнского здоровья и для здоровья новорожденного. ИППП главная предотвращаемая причина бесплодия, особенно у женщин.

Яромич В.И,
Дерматовенеролог,
Заведующий амбулаторным
дерматовенерологическим
отделением №4
УЗ «Минский городской клинический
Центр дерматовенерологии» г.Минска

